



### 3-Substituted 1-(2-chlorothiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkanes.

Patent Number: ☐ EP0285985  
 Publication date: 1988-10-12  
 Inventor(s): WOLF HILMAR DR; BECKER BENEDIKT DR; HOMEYER BERNHARD DR; STENDEL WILHELM DR  
 Applicant(s): BAYER AG (DE)  
 Requested Patent: ☐ DE3712307  
 Application Number: EP19880105053 19880329  
 Priority Number(s): DE19873712307 19870410  
 IPC Classification: C07D417/06 ; C07D417/14 ; C07F9/65 ; A01N43/78 ; A01N57/32  
 EC Classification: A01N51/00, A01N53/00, A01N57/32, C07D417/06, C07F9/6558B  
 Equivalents: AU1454188, AU604109, BR8801674, HU47570, ☐ JP63267780, KR9615007, NZ224169, PH25681, ZA8802450

#### Abstract

There are provided novel 3-substituted 1-(2-chlorothiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-

diazacycloalkanes of the formula (I)  in which n represents the numbers 0 or 1 and R represents methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl, C5-C20-alkyl, C3-C10-alkenyl, C3-C10-alkynyl

or one of the groupings -CH<sub>2</sub>-R<1>, -COR<2>, -S(O)m-R<3>,  where R<1> is in each case a substituted or unsubstituted radical selected from the group consisting of phenyl, pyridyl, furyl, thienyl and thiadiazolyl, R<2> is methyl - with the proviso that in that case n is 0 - or substituted or unsubstituted C2-C20-alkyl, substituted or unsubstituted C3-C6-cycloalkyl, substituted or unsubstituted C2-C20-alkenyl, substituted or unsubstituted phenyl, methoxy, C3-C20-alkoxy, benzyloxy or phenoxy, m is 0, 1 or 2, R<3> is substituted or unsubstituted C1-C20-alkyl or substituted or unsubstituted phenyl, Q is oxygen or sulphur, and R<4> and R<5> are each C1-C4-alkyl. The compounds of the formula (I) show powerful activity against animal pests, preferentially against arthropodes and nematodes, in particular against insects and arachnidae.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift  
⑪ DE 37 12307 A1

⑳ Aktenzeichen: P 37 12 307.6  
㉑ Anmeldetag: 10. 4. 87  
㉒ Offenlegungstag: 20. 10. 88

⑤ Int. Cl. 4:  
C07D 417/06

C 07 D 417/14  
A 01 N 43/78  
A 01 N 43/88  
// (C07D 277/32,  
233:16,  
239:12)C07D 213:38,  
285:02,307:66,333:36  
(A01N 43/78,57:02,  
63:02,47:30,47:10,  
29:00,37:00)

Behördeneigentum


DE 37 12307 A1

⑦ Anmelder:  
Bayer AG, 5090 Leverkusen, DE


⑧ Erfinder:  
Wolf, Hilmar, Dr., 4018 Langenfeld, DE; Becker,  
Benedikt, Dr., 4020 Mettmann, DE; Homeyer,  
Bernhard, Dr., 5090 Leverkusen, DE; Stendel,  
Wilhelm, Dr., 5600 Wuppertal, DE

⑤ 3-Substituierte 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane

Es werden neue 3-substituierte  
1-(2-Chlor-thiazol-5-ylmethyl)-  
2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane  
der Formel (I)



bereitgestellt, in welcher  
n für die Zahlen 0 oder 1 steht und  
R für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-  
Butyl, C<sub>5</sub>-C<sub>20</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Alkenyl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Alkynyl oder für  
eine der Gruppierungen -CH<sub>2</sub>-R<sup>1</sup>, -COR<sup>2</sup>, -S(O)<sub>m</sub>-R<sup>3</sup>,



steht,

wobei


R<sup>1</sup> für jeweils einen gegebenenfalls substituierten Rest der  
Reihe Phenyl, Pyridyl, Furyl, Thienyl oder Thiadiazolyl steht,  
R<sup>2</sup> für Methyl steht - mit der Maßgabe, daß dann n für 0 steht -  
oder für gegebenenfalls substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>20</sub>-Alkyl, gege-  
benenfalls substituiertes C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, gegebenenfalls  
substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>20</sub>-Alkenyl, gegebenenfalls substituiertes  
Phenyl, für Methoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>20</sub>-Alkoxy, Benzoyloxy oder Phenoxy  
steht,  
m für die Zahlen 0, 1 oder 2 steht,  
R<sup>3</sup> für gegebenenfalls substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>-Alkyl oder für  
gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht,  
Q für Sauerstoff oder Schwefel steht und  
R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl stehen.

Die Verbindungen der Formel (I) besitzen eine stark ausge-  
prägte Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge, vorzugs-  
weise gegen Arthropoden und Nematoden, insbesondere  
gegen Insekten und Spinnentiere.

DE 37 12307 A1

## Patentansprüche

1. 3-substituierte 1-(2-Chlorthiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der allgemeinen Formel (I)




(I)

in welcher

$n$  für die Zahlen 0 oder 1 steht und

$R$  für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl,  $C_5-C_{20}$ -Alkyl,  $C_3-C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3-C_{10}$ -Alkynyl oder für eine der Gruppierungen



steht, wobei

$R^1$  für jeweils einen gegebenenfalls substituierten Rest der Reihe Phenyl, Pyridyl, Furyl, Thienyl oder Thiadiazolyl steht,

$R^2$  für Methyl steht — mit der Maßgabe, daß dann  $n$  für 0 steht — oder für gegebenenfalls substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkyl, gegebenenfalls substituiertes  $C_3-C_6$ -Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkenyl, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, für Methoxy,  $C_3-C_{20}$ -Alkoxy, Benzyloxy oder Phenoxy steht,

$m$  für die Zahlen 0, 1 oder 2 steht,

$R^3$  für gegebenenfalls substituiertes  $C_1-C_{20}$ -Alkyl oder für gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht,



$Q$  für Sauerstoff oder Schwefel steht und

$R^4$  und  $R^5$  für  $C_1-C_4$ -Alkyl stehen.

2. 3-substituierte 1-(2-Chlorthiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der Formel (I) gemäß Anspruch 1, in welcher

$n$  für die Zahlen 0 oder 1 steht,

$R$  für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl,  $C_5-C_{20}$ -Alkyl,  $C_3-C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3-C_{10}$ -Alkynyl oder für eine der Gruppierungen



steht, wobei

$R^1$  für gegebenenfalls durch Halogen, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxycarbonyl substituiertes Phenyl, gegebenenfalls durch Halogen, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxycarbonyl substituiertes Pyridyl oder für einen gegebenenfalls durch Halogen,  $C_1-C_4$ -Alkyl,  $C_1-C_4$ -Halogenalkyl substituierten Rest der Reihe Furyl, Thienyl, Thiazolyl und Thiadiazolyl steht,

$R^2$  für Methyl steht — mit der Maßgabe, daß dann  $n$  für 0 steht — oder für gegebenenfalls durch Halogen, Cyano,  $C_1-C_4$ -Alkoxy substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkyl, gegebenenfalls durch Halogen,  $C_1-C_4$ -Alkyl substituiertes  $C_3-C_6$ -Cycloalkyl, gegebenenfalls durch Halogen substituiertes

$C_2-C_{20}$ -Alkenyl, gegebenenfalls durch Halogen,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxy-carbonyl substituiertes Phenyl, Methoxy,  $C_3-C_{20}$ -Alkoxy, Benzyloxy oder Phenoxy steht,

$m$  für die Zahlen 0, 1 oder 2 steht,

$R^3$  für gegebenenfalls durch Halogen substituiertes  $C_1-C_{20}$ -Alkyl oder für gegebenenfalls durch Halogen,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxy-carbonyl substituiertes Phenyl steht,


$Q$  für Sauerstoff oder Schwefel steht,

$R^4$  und  $R^5$  für  $C_1-C_4$ -Alkyl stehen.

3. 3-substituierte 1-(2-Chlorthiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der Formel (I) gemäß Anspruch 1, in welcher

$n$  für Null steht und

$R$  für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec.-Butyl,  $C_5-C_{18}$ -Alkyl,  $C_3-C_6$ -Alkenyl,  $C_3-C_4$ -Alkynyl oder für eine der Gruppierungen



steht, wobei

$R^1$  für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Methyl, Methoxy oder  $C_1-C_2$ -Alkoxy-carbonyl substituiertes Phenyl, gegebenenfalls durch Chlor oder Methyl substituiertes Pyridyl, gegebenenfalls durch Chlor oder Methyl substituiertes Furyl, gegebenenfalls durch Chlor oder Methyl substituiertes Thienyl oder gegebenenfalls durch Chlor oder Methyl substituiertes Thiazolyl steht,


$R^2$  für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Trifluormethyl, Cyano, Nitro, Methoxy substituierte Reste der Reihe  $C_1-C_{18}$ -Alkyl,  $C_2-C_{18}$ -Alkenyl, Phenyl steht oder für  $C_3-C_8$ -Alkoxy steht,

$R^3$  für gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiertes  $C_1-C_8$ -Alkyl, gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Methyl, Trifluormethyl, Methoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy,  $C_1-C_2$ -Alkoxy-carbonyl substituiertes Phenyl steht,

$Q$  für Sauerstoff oder Schwefel steht, und

$R^4$  und  $R^5$  für  $C_1-C_3$ -Alkyl stehen.


4. Verfahren zur Herstellung von 3-substituierten 1-(2-Chlorthiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkanen der allgemeinen Formel (I)



in welcher

$n$  für die Zahlen 0 oder 1 steht und

$R$  für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec.-Butyl,  $C_5-C_{20}$ -Alkyl,  $C_3-C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3-C_{10}$ -Alkynyl oder für eine der Gruppierungen



steht, wobei

$R^1$  für jeweils einen gegebenenfalls substituierten Rest der Reihe Phenyl, Pyridyl, Furyl, Thienyl oder Thiadiazolyl steht,

$R^2$  für Methyl steht — mit der Maßgabe, daß dann  $n$  für 0 steht — oder für gegebenenfalls substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkyl, gegebenenfalls substituiertes  $C_3-C_6$ -Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkenyl, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, für Methoxy,  $C_3-C_{20}$ -Alkoxy, Benzyloxy oder Phenoxy steht,


$m$  für die Zahlen 0, 1 oder 2 steht,

$R^3$  für gegebenenfalls substituiertes  $C_1-C_{20}$ -Alkyl der für gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht,

$Q$  für Sauerstoff oder Schwefel steht und

$R^4$  und  $R^5$  für  $C_1-C_4$ -Alkyl stehen,

dadurch gekennzeichnet, daß man 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacyclo-alkane der allgemeinen Formel (II)



(II)

in welcher

$n$  die oben angegebene Bedeutung hat, mit Halogenverbindungen der allgemeinen Formel (III)

$X-R$

(III)

in welcher

$R$  die oben angegebene Bedeutung hat und  $X$  für Halogen steht,

gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umsetzt.

5. Schädlingsbekämpfungsmittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem 3-substituierten 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkan der Formel (I).

6. Verfahren zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen, dadurch gekennzeichnet, daß man 3-substituierte 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der Formel (I) auf tierische Schädlinge und/oder ihren Lebensraum einwirken läßt.

7. Verwendung von 3-substituierten 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkanen der Formel (I) zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen.


8. Verfahren zur Herstellung von Mitteln gegen tierische Schädlinge, dadurch gekennzeichnet, daß man 3-substituierte 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der Formel (I) mit Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Mitteln vermischt.

#### Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft neue 3-substituierte 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung in Schädlingsbekämpfungsmitteln, insbesondere als Insektizide.


Es ist bereits bekannt, daß bestimmte organische Nitroverbindungen, wie z. B. 2-Nitromethylen-2H-tetrahydro-1,3-thiazin, insektizide Eigenschaften aufweisen (vgl. US-PS 39 93 648).

Es wurden nun die neuen 3-substituierten 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der allgemeinen Formel (I)



(I)

in welcher

 $n$  für die Zahlen 0 oder 1 steht undR für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl,  $C_5-C_{20}$ -Alkyl,  $C_3-C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3-C_{10}$ -Alkyl oder für eine der Gruppierungen


steht, wobei

 $R^1$  für jeweils einen gegebenenfalls substituierten Rest der Reihe Phenyl, Pyridyl, Furyl, Thienyl oder Thiadiazolyl steht, $R^2$  für Methyl steht — mit der Maßgabe, daß dann  $n$  für 0 steht — oder für gegebenenfalls substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkyl, gegebenenfalls substituiertes  $C_3-C_6$ -Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkenyl, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, für Methoxy,  $C_3-C_{20}$ -Alkoxy, Benzyl- oder Phenoxy steht, $m$  für die Zahlen 0, 1 oder 2 steht, $R^3$  für gegebenenfalls substituiertes  $C_1-C_{20}$ -Alkyl oder für gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht,

Q für Sauerstoff oder Schwefel steht und

 $R^4$  und  $R^5$  für  $C_1-C_4$ -Alkyl stehen.Als Substituenten für  $R^1$  = gegebenenfalls substituiertes Phenyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxycarbonyl.Als Substituenten für  $R^1$  = gegebenenfalls substituiertes Pyridyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxycarbonyl.Als Substituenten für  $R^1$  = gegebenenfalls substituiertes Furyl, Thienyl, Thiazolyl oder Thiadiazolyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen,  $C_1-C_4$ -Alkyl,  $C_1-C_4$ -Halogenalkyl.Als Substituenten für  $R^2$  = gegebenenfalls substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen, Cyano,  $C_1-C_4$ -Alkoxy.Als Substituenten für  $R^2$  = gegebenenfalls substituiertes  $C_3-C_6$ -Cycloalkyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen,  $C_1-C_4$ -Alkyl.Als Substituenten für  $R^2$  = gegebenenfalls substituiertes  $C_2-C_{20}$ -Alkenyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen.Als Substituenten für  $R^2$  = gegebenenfalls substituiertes Phenyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxycarbonyl.Als Substituenten für  $R^3$  = gegebenenfalls substituiertes  $C_1-C_{20}$ -Alkyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen.Als Substituenten für  $R^3$  = gegebenenfalls substituiertes Phenyl kommen vorzugsweise in Frage: Halogen,  $C_1-C_4$ -Alkyl, Trifluormethyl, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxycarbonyl.

Weiter wurde gefunden, daß man die neuen 3-substituierten 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der allgemeinen Formel (I) erhält, wenn man 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der allgemeinen Formel (II)



(II)

in welcher  
 n die oben angegebene Bedeutung hat,  
 mit Halogenverbindungen der allgemeinen Formel (III)

X—R

(III)

in welcher

R die oben angegebene Bedeutung hat und  
 X für Halogen steht,

gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umgesetzt.

Die neuen 3-substituierten 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane der Formel (I) zeichnen sich durch hohe Wirksamkeit als Insektizide aus. Überraschenderweise zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) erheblich stärkere insektizide Wirkung als nach Struktur und Wirkprofil vergleichbare organische Nitroverbindungen, wie z. B. 2-Nitromethylen-2H-tetrahydro-1,3-thiazin.

Die Erfindung betrifft vorzugsweise Verbindungen der Formel (I), in welcher

n für Null steht und  
 R für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl oder C<sub>3</sub>—C<sub>18</sub>-Alkyl, für C<sub>3</sub>—C<sub>6</sub>-Alkenyl oder C<sub>3</sub>—C<sub>4</sub>-Alkynyl steht, oder für die Gruppierung —CH<sub>2</sub>—R<sup>1</sup> steht, in welcher  
 R<sup>1</sup> für Phenyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Methyl, Methoxy oder C<sub>1</sub>—C<sub>2</sub>-Alkoxy-carbonyl substituiert ist], Pyridyl [welches gegebenenfalls durch Chlor oder Methyl substituiert ist], Furyl, Thienyl oder Thiazolyl [welche gegebenenfalls durch Chlor oder Methyl substituiert sind] steht,

in welcher weiter

R für die Gruppierung —CO—R<sup>2</sup> steht, in welcher  
 R<sup>2</sup> für C<sub>1</sub>—C<sub>18</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>—C<sub>18</sub>-Alkenyl, Phenyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Trifluormethyl, Cyano, Nitro oder Methoxy substituiert ist] oder C<sub>3</sub>—C<sub>8</sub>-Alkoxy steht,


in welcher weiter

R für die Gruppierung —SO<sub>2</sub>—R<sup>3</sup> steht, in welcher  
 R<sup>3</sup> für C<sub>1</sub>—C<sub>8</sub>-Alkyl [welches gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiert ist] oder Phenyl [welches gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Methyl, Trifluormethyl, Methoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy und/oder C<sub>1</sub>—C<sub>2</sub>-Alkoxy-carbonyl ist] steht,

in welcher weiter

R für die Gruppierung

55




steht, in welcher  
 Q für Sauerstoff oder Schwefel steht und  
 R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> für C<sub>1</sub>—C<sub>3</sub>-Alkyl stehen.

65

Verwendet man zur Durchführung des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens für die Verbindungen der Formel (I) als Ausgangsstoffe beispielsweise 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-imidazolidin und Pro-

pargylbromid, so kann die Reaktion dieser Verbindungen durch das folgende Formelschema skizziert werden:



Die beim erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren als Ausgangsstoffe zu verwendenden 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-1,3-diazacycloalkane sind durch die Formel (II) allgemein definiert. In dieser Formel steht  $n$  vorzugsweise für Null. Als Ausgangsverbindung der Formel (II) wird somit 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-imidazolidin bevorzugt.

Die Ausgangsstoffe der Formel (II) sind bereits bekannt (vgl. EP-A 192 060).

Die weiter als Ausgangsstoffe zu verwendenden Halogenverbindungen sind durch die Formel (III) allgemein definiert. In dieser Formel (III) steht R vorzugsweise für diejenigen Reste, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Stoffe der Formel (I) vorzugsweise für R genannt wurden, und X steht vorzugsweise für Chlor oder Brom.

Als Beispiele für die Ausgangsstoffe der Formel (III) seien genannt:

Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutyl-, sec-Butyl-, Pentyl-, Isopentyl-, sec-Pentyl-, Hexyl-, Octyl-, Decyl-, Dodecyl-, Hexadecyl- und Octadecyl-chlorid bzw. -bromid, Allyl-, Crotyl- und Propargyl-chlorid bzw. -bromid, Benzyl-, 4-Fluor-benzyl-, 4-Chlor-benzyl-, 2-Chlor-benzyl- und 4-Methyl-benzyl-chlorid bzw. -bromid, 2-Chlor-5-chlormethyl-pyridin, 2-Chlor-5-chlormethyl-thiazol, Acetylchlorid, Propionsäure- und Buttersäure-chlorid, Pentansäure-, Hexansäure-, Octansäure-, Decansäure-, Dodecansäure-, Tetradecansäure-, Hexadecansäure- und Octadecansäure-chlorid, Acrylsäure- und Crotonsäure-chlorid, Benzoessäure-, 4-Fluor-benzoessäure-, 4-Chlor-benzoessäure-, 4-Nitro-benzoessäure- und 4-Methylbenzoessäure-chlorid, Chlormeisensäure-propylester, -butylester, -pentylester, -hexylester, -heptylester und -octylester, Methan-, Ethan-, Chlormethan-, Trifluormethan-, Tetrafluorbutan- und Perfluoroctan-sulfonsäurechlorid, Benzol-, 2-Fluor-benzol-, 2-Chlor-benzol-, 4-Chlor-benzol-, 2,5-Dichlor-benzol-, 2-Brom-benzol-, 2-Cyano-benzol-, 2-Nitro-benzol-, 4-Nitro-benzol-, 2-Trifluormethyl-benzol-, 2-Methyl-benzol-, 4-Methyl-benzol-, 2-Methoxy-benzol-, 2-Difluormethoxy-benzol-, 2-Trifluormethoxy-benzol-, 4-Trifluormethoxy-benzol-, 2-Methoxycarbonyl-benzol-, 4-Methoxycarbonyl-benzol- und 2-Ethoxycarbonyl-benzol-sulfonsäurechlorid, Phosphorsäurechlorid-dimethylester und -diethylester sowie Thiophosphorsäure-chlorid-dimethylester und -diethylester.

**Die Ausgangsstoffe der Formel (III) sind bekannte chemische Verbindungen.**

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung der neuen Verbindungen der Formel (I) wird vorzugsweise unter Verwendung von Verdünnungsmitteln durchgeführt. Als Verdünnungsmittel kommen dabei praktisch alle inerten organischen Lösungsmittel in Frage. Hierzu gehören vorzugsweise aliphatische und aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Petrolether, Benzin, Ligroin, Benzol, Toluol, Xylol, Methylenchlorid, Ethylenchlorid, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Chlorbenzol und o-Dichlorbenzol, Ether wie Diethyl- und Dibutylether, Glykoldimethylether und Diglykoldimethylether, Tetrahydrofuran und Dioxan, Ketone wie Aceton, Methyl-ethyl-, Methyl-isopropyl- und Methyl-isobutyl-keton, Ester wie Essigsäuremethylester und -ethylester, Nitrile wie z. B. Acetonitril und Propionitril, Amide wie z. B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid und N-Methyl-pyrrolidon sowie Dimethylsulfoxid, Tetramethylensulfon und Hexamethylphosphorsäuretriämid.

Als Säureakzeptoren können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren alle üblicherweise für derartige Umsetzungen verwendbaren Säurebindemittel eingesetzt werden. Vorzugsweise in Frage kommen Alkalimetallhydride wie z. B. Natriumhydrid, Alkalimetallhydroxide wie z. B. Natrium- und Kaliumhydroxid, Erdalkalihydroxide wie z. B. Calciumhydroxid, Alkalicarbonate und -alkoholate wie Natrium- und Kaliumcarbonat, Natrium- und Kaliummethylat bzw. -ethylat, ferner aliphatische, aromatische oder heterocyclische Amine, beispielsweise Triethylamin, Trimethylamin, Dimethylanilin, Dimethylbenzylamin, Pyridin, 1,5-Diazabicyclo-[4,3,0]-non-5-en (DBN), 1,8-Diazabicyclo[5,4,0]-undec-7-en (DBU) und 1,4 Diazabicyclo-[2,2,2]-octan (DABCO).

Die Reaktionstemperaturen können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren in einem größeren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen zwischen 0°C und 150°C, vorzugsweise bei Tempe-



raturen zwischen 10°C und 100°C.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird im allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Ausgangsstoffe der Formel (II) und (III) im allgemeinen in angenähert äquimolaren Mengen eingesetzt. Die Ausgangsstoffe werden im allgemeinen bei Raumtemperatur mit dem Säureakzeptor und dem Verdünnungsmittel vermischt, und das Reaktionsgemisch wird bei der angegebenen Reaktionstemperatur bis zum Ende der Umsetzung gerührt. Die Aufarbeitung kann nach üblichen Methoden durchgeführt werden.

Die Wirkstoffe eignen sich zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen, vorzugsweise Arthropoden und Nematoden, insbesondere Insekten und Spinnentieren, die in der Landwirtschaft, in Forsten, im Vorrats- und Materialschutz sowie auf dem Hygienesektor vorkommen. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam. Zu den obenerwähnten Schädlingen gehören:

- Aus der Ordnung der Isopoda z. B. *Oniscus asellus*, *Armadillidium vulgare*, *Porcellio scaber*.
- Aus der Ordnung der Diplopoda z. B. *Blaniulus guttulatus*.
- 15 Aus der Ordnung der Chilopoda z. B. *Geophilus carpophagus*, *Scutigera spec.*
- Aus der Ordnung der Symphyla z. B. *Scutigera* spp.
- Aus der Ordnung der Thysanura z. B. *Lepisma saccharina*.
- Aus der Ordnung der Collembola z. B. *Onychiurus armatus*.
- Aus der Ordnung der Orthoptera z. B. *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*, *Leucophaea maderae*, *Blattella germanica*, *Acheta domesticus*, *Gryllotalpa* spp., *Locusta migratoria migratorioides*, *Melanoplus differentialis*, *Schistocerca gregaria*.
- 20 Aus der Ordnung der Dermaptera z. B. *Forficula auricularia*.
- Aus der Ordnung der Isoptera z. B. *Reticulitermes* spp.
- Aus der Ordnung der Anoplura z. B. *Phylloxera vastatrix*, *Pemphigus* spp., *Pediculus humanus corporis*, *Haematopinus* spp., *Linognathus* spp.
- 25 Aus der Ordnung der Mallophaga z. B. *Trichodectes* spp., *Damalinae* spp.
- Aus der Ordnung der Thysanoptera z. B. *Hercinothrips femoralis*, *Thrips tabaci*.
- Aus der Ordnung der Heteroptera z. B. *Eurygaster* spp., *Dysdercus intermedius*, *Piesma quadrata*, *Cimex lectularius*, *Rhodnius prolixus*, *Triatoma* spp.
- 30 Aus der Ordnung der Homoptera z. B. *Aleurodes brassicae*, *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*, *Aphis gossypii*, *Brevicoryne brassicae*, *Cryptomyzus ribis*, *Aphis fabae*, *Doralis pomi*, *Eriosoma lanigerum*, *Hyalopterus arundinis*, *Macrosiphum avenae*, *Myzus* spp., *Phorodon humuli*, *Rhopalosiphum padi*, *Empoasca* spp., *Euscelis bilobatus*, *Nephotettix cincticeps*, *Lecanium corni*, *Saissetia oleae*, *Laodelphax striatellus*, *Nilaparvata lugens*, *Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus hederae*, *Pseudococcus* spp. *Psylla* spp.
- 35 Aus der Ordnung der Lepidoptera z. B. *Pectinophora gossypiella*, *Bupalus piniarius*, *Cheimatobia brumata*, *Lithocolletis blancardella*, *Hyponomeuta padella*, *Plutella maculipennis*, *Malacosoma neustria*, *Euproctis chrysorrhoea*, *Lymantria* spp., *Bucculatrix thurberiella*, *Phyllocnistis citrella*, *Agrotis* spp., *Euxoa* spp., *Feltia* spp., *Earias insulana*, *Heliothis* spp., *Spodoptera exigua*, *Mamestra brassicae*, *Panolis flammea*, *Prodenia litura*, *Spodoptera* spp., *Trichoplusia ni*, *Carpocapsa pomonella*, *Pieris* spp., *Chilo* spp., *Pyrausta nubilalis*, *Ephestia kuehniella*, *Galleria mellonella*, *Tineola bisselliella*, *Tinea pellionella*, *Hofmannophila pseudospretella*, *Cacoecia podana*, *Capua reticulana*, *Choristoneura fumiferana*, *Clysia ambiguella*, *Homona magnanima*, *Tortrix viridana*.
- 40 Aus der Ordnung der Coleoptera z. B. *Anobium punctatum*, *Rhizopertha dominica*, *Acanthoscelides obtectus*, *Acanthoscelides obtectus*, *Hylotrupes bajulus*, *Agelastica alni*, *Leptinotarsa decemlineata*, *Phaedon cochleariae*, *Diabrotica* spp., *Psylliodes chrysocephala*, *Epilachna varivestis*, *Atomaria* spp., *Oryzaephilus surinamensis*, *Anthrenus* spp., *Sitophilus* spp., *Otiorynchus sulcatus*, *Cosmopolites sordidus*, *Ceuthorrhynchus assimilis*, *Hypera postica*, *Dermestes* spp., *Trogoderma* spp., *Anthrenus* spp., *Attagenus* spp., *Lyctus* spp., *Meligethes aeneus*, *Ptinus* spp., *Niptus hololeucus*, *Gibbium psyllodes*, *Tribolium* spp., *Tenebrio molitor*, *Agriotes* spp., *Conoderus* spp., *Melolontha melolontha*, *Amphimallon solstitialis*, *Costelytra zealandica*.
- 45 Aus der Ordnung der Hymenoptera z. B. *Diprion* spp., *Hoplocampa* spp., *Lasius* spp., *Monomorium pharaonis*, *Vespa* spp.
- 50 Aus der Ordnung der Diptera z. B. *Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Culex* spp., *Drosophila melanogaster*, *Musca* spp., *Fannia* spp., *Calliphora erythrocephala*, *Lucilia* spp., *Chrysomya* spp., *Cuterebra* spp., *Gastrophilus* spp., *Hyppobosca* spp., *Stomoxys* spp., *Oestrus* spp., *Hypoderma* spp., *Tabanus* spp., *Tannia* spp., *Bibio hortulanus*, *Oscinella frit*, *Phorbia* spp., *Pegomya hyoscyami*, *Ceratitis capitata*, *Dacus oleae*, *Tipula paludosa*.
- 55 Aus der Ordnung der Siphonaptera z. B. *Xenopsylla cheopis*, *Ceratophyllus* spp.
- Aus der Ordnung der Arachnida z. B. *Scorpio maurus*, *Latrodectus mactans*.
- Aus der Ordnung der Acarina z. B. *Acarus siro*, *Argas* spp., *Ornithodoros* spp., *Dermanyssus gallinae*, *Eriophyes* spp., *Phyllocoptura oleivora*, *Boophilus* spp., *Rhipicephalus* spp., *Amblyomma* spp., *Hyalomma* spp., *Ixodes* spp., *Psoroptes* spp., *Chorioptes* spp., *Sarcoptes* spp., *Tarsonemus* spp., *Bryobia praetiosa*, *Panonychus* spp., *Tetranychus* spp.
- 60

Zu den pflanzenparasitären Nematoden gehören *Pratylenchus* spp., *Radopholus similis*, *Ditylenchus dipsaci*, *Tylenchulus semipenetrans*, *Heterodera* spp., *Meloidogyne* spp., *Aphelenchoides* spp., *Longidorus* spp., *Xiphinema* spp., *Trichodorus* spp.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe der Formel (I) zeichnen sich durch hervorragende insektizide Wirksamkeit aus. Sie zeigen insbesondere beim Einsatz als Blattinsektizide und Bodeninsektizide hervorragende Wirkung, gegen z. B. gegen Reiszikaden (z. B. *Nephotettix cincticeps*), gegen Blattläuse (z. B. *Myzus persicae*) und gegen Käferlarven (z. B. *Phaedon cochleariae*).

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe der Formel (I) eignen sich auch zur Bekämpfung von Arthropoden, die landwirtschaftliche Nutztiere, wie z. B. Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine, Esel, Kamele, Büffel, Kaninchen, Hühner, Puten, Enten, Gänse, Bienen, sonstige Haustiere wie z. B. Hunde, Katzen, Stubenvögel, Aquarienfische sowie sog. Versuchstiere, wie z. B. Hamster, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse befallen. Durch die Bekämpfung dieser Arthropoden sollen Todesfälle und Leistungsminderungen (bei Fleisch, Milch, Wolle, Häuten, Eiern, Honig usw.) vermindert werden, so daß durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Wirkstoffe eine wirtschaftlichere und einfachere Tierhaltung möglich ist.

Die Anwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe geschieht im Veterinärsektor in bekannter Weise durch enterale Verabreichung in Form von beispielsweise Tabletten, Kapseln, Tränken, Drenchen, Granulaten, Pasten, Boli, des feed-through-Verfahrens, von Zäpfchen, durch parenterale Verabreichung, wie zum Beispiel durch Injektionen (intramuskulär, subcutan, intravenös, intraperitoneal u. a.), Implantate, durch nasale Applikation, durch dermale Anwendung in Form beispielsweise des Tauchens oder Badens (Dippen), Sprühens (Spray), Aufgießens (Pour-on und Spot-on), des Waschens, des Einpuderns sowie mit Hilfe von wirkstoffhaltigen Formkörpern, wie Halsbändern, Ohrmarken, Schwanzmarken, Gliedmaßenbändern, Halftern, Markierungsvorrichtungen usw.

Die Wirkstoffe können in Abhängigkeit von ihren jeweiligen physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften in übliche Formulierungen übergeführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Pasten, Granulate, Aerosole, Wirkstoff-imprägnierte Natur- und synthetische Stoffe, Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen und in Hüllmassen für Saatgut, ferner in Formulierungen mit Brennsätzen, wie Räucherpatronen, -dosen, -spiralen u. ä., sowie ULV-Kalt- und Warmnebel-Formulierungen.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z. B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit Streckmitteln, also flüssigen Lösungsmitteln, unter Druck stehenden verflüssigten Gasen und/oder festen Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von oberflächenaktiven Mitteln, also Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln und/oder schaum erzeugenden Mitteln. Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z. B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommen im wesentlichen in Frage: Aromaten, wie Xylol, Toluol, oder Alkyl-naphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z. B. Erdölfraktionen, Alkohole, wie Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel, wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser; mit verflüssigten gasförmigen Streckmitteln oder Trägerstoffen sind solche Flüssigkeiten gemeint, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z. B. Aerosol-Treibgase, wie Halogenkohlenwasserstoffe sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid; als feste Trägerstoffe kommen in Frage: z. B. natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und Silikate; als feste Trägerstoffe für Granulate kommen in Frage: z. B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Kokosnußschalen, Maiskolben und Tabakstengel; als Emulgier und/oder schaum erzeugende Mittel kommen in Frage: z. B. nichtionogene und anionische Emulgatoren, wie Polyoxyethylen-Fettsäure-Ester, Polyoxyethylen-Fettalkohol-Ether, z. B. Alkylaryl-polyglykol-Ether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate sowie Eiweißhydrolysate; als Dispergiermittel kommen in Frage: z. B. Lignin-Sulfitablauge und Methylcellulose.

Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabicum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide, wie Kephaleine und Lecithine, und synthetische Phospholipide. Weitere Additive können mineralische und vegetabile Öle sein.

Es können Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z. B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyankobalt und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

Die Formulierungen enthalten im allgemeinen zwischen 0,1 und 95 Gewichtsprozent Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,5 und 90%.

Die Wirkstoffe können in ihren handelsüblichen Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit anderen Wirkstoffen, wie Insektiziden, Lockstoffen, Sterilantien, Akariziden, Nematiziden, Fungiziden, wachstumsregulierenden Stoffen oder Herbiziden vorliegen. Zu den Insektiziden zählen beispielsweise Phosphorsäureester, Carbamate, Carbonsäureester, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phenylharnstoffe, durch Mikroorganismen hergestellte Stoffe u. a.

Die Wirkstoffe können ferner in ihren handelsüblichen Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit Synergisten vorliegen. Synergisten sind Verbindungen, durch die die Wirkung der Wirkstoffe gesteigert wird, ohne daß der zugesetzte Synergist selbst aktiv wirksam sein muß.


Der Wirkstoffgehalt der aus den handelsüblichen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen kann in weiten Bereichen variieren. Die Wirkstoffkonzentration der Anwendungsformen kann von 0,0000001 bis 95 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,0001 und 1 Gew.-% liegen.

Die Anwendung geschieht in einer den Anwendungsformen angepaßten üblichen Weise.

Bei der Anwendung gegen Hygiene- und Vorratsschädlinge zeichnen sich die Wirkstoffe durch eine hervorragende Residualwirkung auf Holz und Ton sowie durch eine gute Alkalistabilität auf gekalkten Unterlagen aus.

## Herstellungsbeispiele


## Beispiel 1



15 Eine Mischung aus 3,1 g (0,012 Mol) 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-imidazolidin, 1,9 g (0,012 Mol) 4-Chlor-benzylchlorid, 1,6 g (0,012 Mol) Kaliumcarbonat und 50 ml Acetonitril wird unter Rühren vier Stunden lang zum Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird filtriert, und vom Filtrat wird das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum abdestilliert. Der verbleibende Rückstand wird mit 50 ml Diethylether verrührt und das kristallin angefallene Produkt durch Absaugen isoliert.

20 Man erhält 3,65 g (79% der Theorie) 1-(2-Chlor-thiazol-5-yl-methyl)-2-nitroimino-3-(4-chlor-benzyl)-imidazolidin vom Schmelzpunkt 96°C.










Analog Beispiel 1 und entsprechend der allgemeinen Beschreibung des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens können die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Verbindungen der Formel (I) hergestellt werden.



(I)

Tabelle

Weitere Beispiele für Verbindungen der Formel (I)


Beispiel Nr.	<i>n</i>	-R	Schmelz- punkt (°C)
2	0		90
3	1		
4	0	$-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$	(*)
5	1	$-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$	
6	1		
7	0		165
8	1		
9	0	$-\text{SO}_2-\text{CH}_3$	163
10	1	$-\text{SO}_2-\text{CH}_3$	
11	0	$-\text{CO}-\text{CH}_3$	124
12	1	$-\text{CO}-\text{CH}_3$	
13	0		103
14	1		
15	0	$-\text{CO}-(\text{CH}_2)_{10}-\text{CH}_3$	101
16	1	$-\text{CO}-(\text{CH}_2)_{10}-\text{CH}_3$	
17	0	$-(\text{CH}_2)_{11}-\text{CH}_3$	124
18	1	$-(\text{CH}_2)_{11}-\text{CH}_3$	
19	0	$-\text{CO}-(\text{CH}_2)_{16}-\text{CH}_3$	102
20	1	$-\text{CO}-(\text{CH}_2)_{16}-\text{CH}_3$	
21	0	$-\text{COO}-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}_3$	73
22	1	$-\text{COO}-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}_3$	
23	0	$-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$	
24	1	$-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$	
25	0		
26	0		
27	0	$-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$	

Beispiel Nr.	<i>n</i>	-R	Schmelz- punkt (°C)
28	0	$-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{F}$	
29	0	$-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Br}$	
30	0	$-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2$	
31	0	$-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$	
32	0	$-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OCH}_3$	
33	0	$-\text{SO}_2-\text{C}_6\text{H}_5$	
34	0	$-\text{SO}_2-\text{CH}_2\text{Cl}$	
35	0	$-\text{SO}_2\text{CF}_3$	
36	0	$-\text{CO}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	
37	0	$-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_5$	
38	0	$-\text{P}(=\text{S})(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$	
39	0	$-\text{CH}_3$	
40	0	$-\text{C}_7\text{H}_5$	
41	0	$-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	
42	0	$-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	
43	0	$-\text{C}_7\text{H}_{11}$	
44	0	$-\text{C}_8\text{H}_{13}$	
45	0	$-\text{COOC}_4\text{H}_9$	
46	0	$-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_3(\text{Cl})_2$	
47	0	$-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4\text{F}$	
48	0	$-\text{CO}-\text{CH}(\text{CH}_2)_2$	

Beispiel Nr.	n	-R	Schmelzpunkt (°C)
49	0		5
50	0		10
51	0		15
52	0		20
(*) $\delta_{CH_2}$ : 4,62 $\left[ {}^1H\text{-NMR-Signal für } \begin{array}{c} \text{N} \\   \\ \text{Cl}-\text{C}-\text{S}-\text{C}-\text{CH}_3 \\   \\ \text{CH}_2 \end{array} \right]$			

## Verwendungsbeispiele

In den nachfolgenden Verwendungsbeispielen wird die nachstehend angegebene Verbindung als Vergleichssubstanz eingesetzt:



(A)

2-Nitromethylen-2H-tetrahydro-1,3-thiazin (vgl. US-PS 39 93 648).

## Beispiel A

## Nephrotettix-Test

Lösungsmittel: 7 Gewichtsteile Dimethylformamid  
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und der angegebenen Menge Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Reiskeimlinge (*Oryza sativa*) werden durch Tauchen in die Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration behandelt und mit der Grünen Reizikade (*Nephrotettix cincticeps*) besetzt, solange die Keimlinge noch feucht sind.

Nach der gewünschten Zeit wird die Abtötung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100%, daß alle Zikaden abgetötet wurden; 0% bedeutet, daß keine Zikaden abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die gemäß den Herstellungsbeispielen (1), (4), (2), (7), (11), (13), (15) und (21) erhaltenen Verbindungen bei einer Wirkstoffkonzentration von 0,0001% eine Wirkung von 70%—100% nach 6 Tagen, während die Vergleichssubstanz (A) nur eine Wirkung von 20% zeigt.

## Beispiel B

## Myzus-Test

Lösungsmittel: 3 Gewichtsteile Dimethylformamid  
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der

angegebenen Menge Lösungsmittel und der angegebenen Menge Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Kohlblätter (*Brassica oleracea*), die stark von der Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*) befallen sind, werden durch Tauchen in die Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration behandelt.

5 Nach der gewünschten Zeit wird die Abtötung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100%, daß alle Blattläuse abgetötet wurden, 0% bedeutet, daß keine Blattläuse abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die gemäß den Herstellungsbeispielen (1), (2), (4), (11) und (13) erhaltenen Verbindungen bei einer Wirkstoffkonzentration von 0,001% nach einem Tag eine Wirkung von 60%–90%, während die Vergleichssubstanz (A) nur eine Wirkung von 10% zeigt.

10

#### Beispiel C

##### Grenzkonzentrations-Test/Wurzelsystemische Wirkung

15 Testinsekt: *Phaedon cochleariae*-Larven  
Lösungsmittel: 3 Gewichtsteile Aceton  
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykoether

20 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel, gibt die angegebene Menge Emulgator zu und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Die Wirkstoffzubereitung wird innig mit Boden vermischt. Dabei spielt die Konzentration des Wirkstoffs in der Zubereitung praktisch keine Rolle, entscheidend ist allein die Wirkstoffgewichtsmenge pro Volumeneinheit Boden, welche in ppm (= mg/l) angegeben wird. Man füllt den behandelten Boden in Töpfe und bepflanzt diese mit Kohl (*Brassica oleracea*). Der Wirkstoff kann so von den Pflanzenwurzeln aus dem Boden aufgenommen und in die Blätter transportiert werden.

25 Für den Nachweis des wurzelsystemischen Effektes werden nach 7 Tagen ausschließlich die Blätter mit den obengenannten Testtieren besetzt. Nach weiteren 2 Tagen erfolgt die Auswertung durch Zählen oder Schätzen der toten Tiere. Aus den Abtötungszahlen wird die wurzelsystemische Wirkung des Wirkstoffs abgeleitet. Sie ist 100%, wenn alle Testtiere abgetötet sind und 0%, wenn noch genau so viele Testinsekten leben wie bei der unbehandelten Kontrolle.

30 Bei diesem Test zeigen z. B. die gemäß den Herstellungsbeispielen (1), (2), (4), (7), (11), (13), (15) und (17) erhaltenen Verbindungen bei einer Wirkstoffkonzentration von 20 ppm eine Wirkung von 100%, während die Vergleichssubstanz (A) keine nachweisbare Wirkung zeigt.

35

#### Beispiel D

##### Grenzkonzentrations-Test/Wurzelsystemische Wirkung

40 Testinsekt: *Myzus persicae*  
Lösungsmittel: 3 Gewichtsteile Aceton  
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykoether

45 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel, gibt die angegebene Menge Emulgator zu und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Die Wirkstoffzubereitung wird innig mit Boden vermischt. Dabei spielt die Konzentration des Wirkstoffs in der Zubereitung praktisch keine Rolle, entscheidend ist allein die Wirkstoffgewichtsmenge pro Volumeneinheit Boden, welche in ppm (= mg/l) angegeben wird. Man füllt den behandelten Boden in Töpfe und bepflanzt diese mit Kohl (*Brassica oleracea*). Der Wirkstoff kann so von den Pflanzenwurzeln aus dem Boden aufgenommen und in die Blätter transportiert werden.

50 Für den Nachweis des wurzelsystemischen Effektes werden nach 7 Tagen ausschließlich die Blätter mit den obengenannten Testtieren besetzt. Nach weiteren 2 Tagen erfolgt die Auswertung durch Zählen oder Schätzen der toten Tiere. Aus den Abtötungszahlen wird die wurzelsystemische Wirkung des Wirkstoffs abgeleitet. Sie ist 100%, wenn alle Testtiere abgetötet sind und 0%, wenn noch genau so viele Testinsekten leben wie bei der unbehandelten Kontrolle.

55 Bei diesem Test zeigen z. B. die gemäß den Herstellungsbeispielen (1), (2), (4), (7), (9), (11), (13), (15), (17) und (19) erhaltenen Verbindungen bei einer Wirkstoffkonzentration von 20 ppm eine Wirkung von 100%, während die Vergleichssubstanz (A) keine nachweisbare Wirkung zeigt.

60

#### Beispiel E

##### Test mit *Lucilia cuprina* resistent-Larven

65 Emulgator: 35 Gewichtsteile Ethylenglykolmonomethylether  
35 Gewichtsteile Nonylphenolpolyglykoether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man drei Gewichtsteile Wirkstoff mit

## OS 37 12 307

sieben Gewichtsteilen des oben angegebenen Gemisches und verdünnt das so erhaltene Konzentrat mit Wasser auf die jeweils gewünschte Konzentration.

Etwa 20 *Lucilia cuprina* res.-Larven werden in ein Teströhrchen gebracht, welches ca. 1 cm<sup>3</sup> Pferdefleisch und 0,5 ml der Wirkstoffzubereitung enthält. Nach 24 Stunden wird der Abtötungsgrad bestimmt.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele überlegene Wirkung gegenüber dem Stand der Technik: (1), (2), (4), (7), (9), (11), (15), (19) und (21). 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65